

ベクルリー®: 用法に関する事項

本剤は、本邦で特例承認されたものであり、現時点で有効性、安全性、品質に係る情報は極めて限られており、引き続き情報を収集しております。また、必ず添付文書の内容も併せてご確認ください。

体重 3.5 kg 以上 40 kg 未満の小児には点滴静注液は推奨されない理由^{1,2}

水性注射液は凍結乾燥製剤に比較して、バイアル中の添加物であるスルホブチルエーテルβ-シクロデキストリンナトリウムが約2倍多く含まれています。非臨床試験において、スルホブチルエーテルβ-シクロデキストリンナトリウムの尿細管への蓄積により、腎機能への影響がみられたため、含有量の少ない凍結乾燥剤の使用を推奨しています。

点滴時間が 30 分から 120 分となっている理由²

御施設及び患者様の状況に合わせた投与を可能とするため、投与時間に幅を持たせています。

有効性・安全性に関して、投与時間との相関を示すようなデータは現時点ではありません。

引用

1. FACT SHEET FOR HEALTH CARE PROVIDERS, EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF REMDESIVIR (GS-5734™)
2. ベクルリー点滴静注液 100mg / ベクルリー点滴静注用 100mg 添付文書

GILEAD 及び GILEAD のロゴは、Gilead Sciences, Inc 又はその関連会社の登録商標です。

© Gilead Sciences, Inc.