

## 保管と取扱いについて

ベクルリー点滴静注液 100 mg、同点滴静注用 100 mg（以下、本剤）は、それぞれ水性注射液、凍結乾燥製剤です。

### 重要な注意点

- 本剤は保存剤を含有しないため、調製後の未使用の希釈液及び使用後の残液は廃棄してください。
- 容器栓栓系に欠陥・変色がなく、溶液中に微粒子がないことを目視で確認してください。欠陥・変色や微粒子がみられた場合は使用しないでください。
- 生理食塩液以外との適合性は確認されていません。他の薬剤と同時に投与しないようにしてください。

### ■共通

- 使用期限を超えた場合は、使用しないでください。

### ■ベクルリー点滴静注液 100 mg（水性注射液）

- 本剤は 2～8℃で保管してください。
- 希釈前に 20～25℃に戻してください。
- 20～25℃で 12 時間を超えて保存しないようにしてください。
- 生理食塩液に添加後、20～25℃で 4 時間又は 2～8℃で 24 時間を超えた溶液は使用せず廃棄してください。

### ■ベクルリー点滴静注用 100 mg（凍結乾燥製剤）

- 本剤は室温で保管してください。
- 注射用水に溶解後、20～25℃で 4 時間又は 2～8℃で 24 時間以内に使用するようになっています。
- 生理食塩液に添加後は、注射用水で溶解してからの時間を含めて、20～25℃で 4 時間又は 2～8℃で 24 時間を超えた溶液は使用せず廃棄してください。

## 安定性

適切な貯法において、ベクルリー点滴静注液 100 mg の有効期間は 24 ヶ月、同点滴静注用 100 mg の有効期間は 36 ヶ月での安定性が確認されています。