



GILEAD

สำหรับผู้ที่จะ รับประทานเดสโควี

ควบคุมการจัดทำโดย

ซินอีจิ โอคะ

ผู้อำนวยการ AIDS Clinical Center,
National Center for Global Health
and Medicine ประเทศญี่ปุ่น

บทนำ / สารบัญ

คุณสมบัติของเดสโควี

วิธีรับประทาน

เมื่อลิ้มรับประทาน
ข้อควรระวัง

ผลข้างเคียง

การรับประทานในช่วงตั้งครรภ์
ข้อควรระวังอื่น

บทนำ

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับประทานเดสโควี
มีคำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีรับประทานเดสโควี วิธีจัดการเมื่อลืมรับประทาน
ผลข้างเคียง ข้อควรระวังในการรับประทาน ฯลฯ กรุณาอ่านก่อนรับประทาน

ทั้งนี้ ในการรับประทานเดสโควีจำเป็นต้องให้แพทย์ตัดสินใจตามอาการและ
สภาพของผู้ป่วย

กรุณาฟังคำอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์ พยาบาล หรือ เภสัชกร
อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานเดสโควี กรุณาปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือ
เภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ใช้เนื้อหาใน "Patient Information of DESCOVY" ที่แนบมากับ "DESCOVY Full Prescribing Information"
ของสหรัฐอเมริกา นำมาแก้ไขบางส่วนแล้วจัดทำเป็นภาษาไทย เนื้อหาภายในได้รับการตรวจสอบจาก อาจารย์ชินอิชิ โอคะ ผู้อำนวยการ
AIDS Clinical Center, National Center for Global Health and Medicine ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่จะรับประทานเดสโควี

สารบัญ

1 บทนำ

3 เดสโควีเป็นยาแบบไหน?

- คุณสมบัติของเดสโควี
- การทำงานของเดสโควี

5 ต้องรับประทานแบบไหน?

- การรับประทานเดสโควีร่วมกับยาอื่น

9 ถ้าลืมรับประทาน?

10 ข้อควรระวังในการรับประทานมีอะไรบ้าง?

- เมื่อเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี
- เมื่อพบอาการของภาวะกรดแลคติก
- เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับตับ

11 ผลข้างเคียงของเดสโควี?

13 การรับประทานในช่วงตั้งครรภ์ควรทำอย่างไร?

- เกี่ยวกับการให้นมบุตร
- หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV

14 มีข้อควรระวังอื่นไหม?

- ข้อควรระวังในชีวิตประจำวัน
- วิธีเก็บรักษาเดสโควี
- วิธีเปิดฝาเดสโควี

เดสโควีเป็นยาแบบไหน?



ลดปริมาณไวรัส HIV*1 ในเลือดของผู้ติดเชื้อ HIV

เดสโควีเป็นยาที่จะช่วยยับยั้งปริมาณของไวรัส HIV ในกระแสเลือด ทำให้ภูมิคุ้มกันที่ด้อยลงไปฟื้นกลับมา และติดเชื้อฉวยโอกาส*2 ได้ยากยิ่งขึ้น

*1 ปริมาณไวรัส HIV ในเลือด

จำนวนไวรัสในพลาสมา (น้ำเลือด) 1 มล. ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้จุดที่ควรเริ่มการรักษาและตัดสินผลของยาต้าน HIV เป้าหมายในการรักษานั้นคือการควบคุมให้ปริมาณของไวรัสอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตรวจหา

*2 การติดเชื้อฉวยโอกาส

โรคติดเชื้อที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่มีความสามารถทำให้เกิดโรคต่ำ และไม่เป็นอันตรายใดๆ ต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ เช่น โรคหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา โรคเริม โรคติดเชื้อ MAC ฯลฯ



คุณสมบัติของเดสโควี


เดสโควีเป็นยาที่มี NRTI 2 ชนิดได้แก่ Emtricitabine และ Tenofovir alafenamide fumarate จึงทำให้เดสโควีช่วยลดภาระการรับประทานยาลงได้ โดยสามารถรับยา 2 ชนิดนี้ได้ในารับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ดเท่านั้น แต่ในการรักษาจะต้องรับประทานเดสโควีร่วมกับยาต้าน HIV อื่นด้วย เดสโควีไม่ใช่ยาสำหรับรักษาโรคเอดส์หรือติดเชื้อ HIV ให้หายขาด รับประทานแล้วยังอาจเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเกิดอาการอื่นได้ จึงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอาการเหล่านี้

การทำงานของเดสโควี

Emtricitabine และ Tenofovir alafenamide fumarate ในเดสโควีจะช่วยป้องกันการเพิ่มจำนวนของ HIV โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HIV reverse transcriptase*3 ที่จำเป็นต่อการเพิ่มจำนวนของ HIV ในร่างกาย

*3 HIV reverse transcriptase

เอนไซม์ พิเศษในไวรัส โดยเป็นหนึ่งในเอนไซม์ ที่จะทำงานเมื่อ HIV เพิ่มจำนวนในร่างกาย



นอกจาก NRTI แล้ว ยังมียาด้าน HIV ที่มีการทำงานแตกต่างกันออกไปอีก เช่น NNRTI, PI, INSTI และ CCR5 Inhibitor การรักษาโรคติดเชื้อ HIV โดยปกติแล้วการรักษา HIV จะรักษาโดยใช้เดสโควี ร่วมกับยาเหล่านี้

ต้องรับประทานแบบไหน?

ปกติให้รับประทานเดสโควีวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด

รับประทานได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลารับประทานอาหาร

เดสโควีมี 2 ประเภท ได้แก่ LT และ HT ซึ่งจะมีปริมาณ Tenofovir alafenamide fumarate ต่างกัน โดยจะแยกใช้ตามการรับประทานร่วมกับยาด้าน HIV อื่น กรุณารับประทานตามใบสั่งยาของแพทย์

ยาที่คุณต้องรับประทานคือ

เดสโควี LT

เม็ด

หากจะรับประทานร่วมกับ

Ritonavir หรือ Cobicistat

เดสโควี LT เป็นยาเม็ดสีเทา ใน 1 เม็ดมี
Emtricitabine 200 มก. และ
Tenofovir alafenamide 10 มก.



เดสโควี HT

เม็ด

หากจะไม่รับประทานร่วมกับ

Ritonavir หรือ Cobicistat

เดสโควี HT เป็นยาเม็ดสีฟ้า ใน 1 เม็ดมี
Emtricitabine 200 มก. และ
Tenofovir alafenamide 25 มก.



เพื่อที่จะคงประสิทธิภาพของยาให้ดีที่สุดอยู่เสมอ การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากไม่ได้รับประทานยาแม้เป็นช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยก็ตาม อาจทำให้ปริมาณไวรัสในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ยาได้ผลน้อยลง หรือทำให้อาการทรุดหนักขึ้นได้ กรุณาปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ ชลช อย่างเคร่งครัดและรับประทานเดสโควีให้ครบทุกวัน

ห้ามตัดสินใจหยุดรับประทานยาเองโดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหาอะไรก็ตาม กรุณาติดต่อทางโรงพยาบาล และขอให้ตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องแล้วปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสภาพร่างกาย



บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การรับประทานเดสโควีร่วมกับยาอื่น

มียาที่ไม่สามารถรับประทานร่วมกับเดสโควีและยาที่ต้องระวังในการรับประทานร่วมด้วย หากรับประทานยาเหล่านี้ร่วมกับเดสโควี อาจทำให้มีผลข้างเคียงหรือมีประสิทธิภาพ ในการรักษาลดลง ดังนั้น กรุณาแจ้งยาทั้งหมดที่รับประทานอยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้ง ยาที่แพทย์สั่ง ยาที่มีจำหน่ายทั่วไป วิตามิน อาหารเสริมประเภทสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ) ต่อแพทย์ เภสัชกร ฯลฯ

 **กรุณาอย่ารับประทานเดสโควี หากรับประทานยาด้าน HIV ยาด้านไวรัส ฯลฯ ดังต่อไปนี้**



● ยาอื่นที่มีส่วนประกอบของ Emtricitabine

- Truvada® Combination Tablets
- Stribild® Combination Tablets
- Odefsey® Combination Tablets
- Symtuza® Combination Tablets
- Emtriva®
- Complera® Combination Tablets
- Genvoya® Combination Tablets
- Biktarvy® Combination Tablets

● ยาอื่นที่มีส่วนประกอบของ Tenofovir DF

- Truvada® Combination Tablets
- Stribild® Combination Tablets
- Viread®
- Tenozet®
- Complera® Combination Tablets

● ยาอื่นที่มีส่วนประกอบของ Tenofovir alafenamide fumarate

- Genvoya® Combination Tablets
- Biktarvy® Combination Tablets
- Odefsey® Combination Tablets
- Symtuza® Combination Tablets

● ยาอื่นที่มีส่วนประกอบของ Lamivudine

- Epzicom® Combination Tablets
- Triumeq® Combination Tablets
- Combivir® Combination Tablets
- Zefix®
- Epivir®

● ยาด้านไวรัส

- Telaprevir (Telavic®)



จำเป็นต้องระวังเป็นพิเศษหากจะรับประทานเดสโควีร่วมกับยาต่อไปนี้ (หรือยาที่มีส่วนประกอบต่อไปนี้)

- **ยากล่อมประสาท / ยาคลายกังวล**
 - Phenobarbital (Phenobal®, etc.)

- **ยาด้านชัก**
 - Carbamazepine (Tegretol®, etc.)
 - Fosphenytoin (Fostoin®)
 - Phenytoin (Aleviatin®, etc.)

- **ยาด้านเชื้อโรค**
 - Rifabutin (Mycobutin®)

- **ยาด้านวัณโรค**
 - Rifampicin (Rifadin®, etc.)

- **ยาด้านไวรัส**
 - Aciclovir (Zovirax®, etc.)
 - Ganciclovir (Denosine®)
 - Valaciclovir hydrochloride (Valtrex®, etc.)
 - Valganciclovir hydrochloride (Valixa®)

- **ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสมุนไพร เซนต์จอห์นเวิร์ต**

ลองเขียนรายการยาที่รับประทานอยู่ในปัจจุบัน

*รวมทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่มีจำหน่ายทั่วไป วิตามิน อาหารเสริมประเภทสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากไม่แน่ใจว่ายาที่รับประทานอยู่ในปัจจุบันอยู่ในรายการยาที่ห้ามรับประทานร่วมหรือต้องระวังหรือไม่

และระหว่างที่รับประทานเดสโควี กรุณาอย่ารับประทานยาใหม่ โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน



ถ้าลืมรับประทาน?

การประยุกต์เพื่อไม่ให้ลืมรับประทานเป็นสิ่งสำคัญ

การรับประทานเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของตัวยา ควรฝึกให้รับประทานเป็นเวลาตามที่กำหนด อาทิ ทำตารางกำหนดการรับประทาน เพื่อป้องกันการลืมรับประทาน



แต่หากลืมรับประทานไปแล้ว ...

เมื่อรู้ว่าลืมรับประทาน ให้รับประทานในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้ง (1 เม็ดเท่านั้น) ให้เร็วที่สุดและต่อจากนั้นให้รับประทานตามกำหนดการ

หากรู้ตัวใกล้กับเวลาที่ต้องรับประทานเม็ดต่อไป ให้รอจนถึงเวลาก่อนค่อยรับประทานและต่อจากนั้นให้รับประทานในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้งตามกำหนดการ

สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดเมื่อลืมรับประทาน!

ห้ามรับประทานเดสโคีมากกว่าปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้ง (2 เม็ดขึ้นไป)

หากไม่แน่ใจว่าควรทำอะไรเมื่อลืมรับประทาน ก็สามารถสอบถามจากแพทย์ เภสัชกร ฯลฯ ได้




ข้อควรระวังในการรับประทานมีอะไรบ้าง?

เมื่อเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี

หากผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี*4 หยุดรับประทานเตสโควี อาจทำให้เกิด อาการของโรคตับอักเสบบีขึ้นอีกครั้ง หรืออาจทำให้อาการทรุดหนักอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเริ่มรับประทานเตสโควีจะต้องตรวจก่อนว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่

*4 ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

เป็นไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง โดยไวรัสตับอักเสบบี จะเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องในเซลล์ตับ แต่จะไม่ฆ่าเซลล์นั้นโดยตรง ทำให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ จึงต้องระวังเป็นพิเศษ คาดว่าในประเทศไทยปีนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ 1.5 ล้านคน



เมื่อพบอาการของภาวะกรดแลคติก

เมื่อรับประทานเตสโควีหรือยาจำพวก NRTI อื่น อาจทำให้เกิด มีกรดแลคติกในเลือดสูงขึ้น และเป็นภาวะกรดแลคติกได้ ภาวะกรดแลคติกเป็นสภาวะที่อันตรายซึ่งอาจส่งผลถึงชีวิต ดังนั้นหากมีอาการต่อไปนี้ กรุณาติดต่อหรือรับการตรวจที่โรงพยาบาลทันที

- รู้สึกอ่อนล้า อ่อนแรงอย่างรุนแรง
- มือเท้าเย็น ชา เจ็บปวด
- ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
- เวียนศีรษะ
- หายใจติดขัด
- ปวดท้องและคลื่นไส้
- หัวใจเต้นแรง ไม่เป็นจังหวะ

เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับตับ

เมื่อรับประทานเตสโควีหรือยาจำพวก NRTI อื่น อาจทำให้มีไขมันที่ตับ (ตับต่งไขมัน) ตับมีขนาดใหญ่อขึ้น (ตับโต) หากมีอาการต่อไปนี้ กรุณาติดต่อหรือรับการตรวจที่โรงพยาบาลทันที



- ผิวหนังหรือตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ดีซ่าน)
- ไม่อยากอาหารต่อเนื่องหลายวัน
- บัสสวามีสีเข้มกว่าเดิม
- มีอาการคลื่นไส้
- อุจจาระมีสีขาวกว่าเดิม
- เจ็บหรือปวดอย่างมากบริเวณท้องฝั่งขวา

ผลข้างเคียงของเดสโควี?

หลังรับประทานเกินเดสโควีอาจเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงดังนี้

- เกิดอาการโรคตับอักเสบ B ขึ้นอีกครั้งหรือทำให้อาการแย่ลง ภาวะกรดแลคติก อาการตับคั่งไขมันและอาการตับโต ตามที่ระบุใน “ข้อควรระวังในการรับประทานมีอะไรบ้าง” (หน้า 10)
- การเปลี่ยนแปลงต่อรูปร่างของร่างกาย*5
- การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่มากขึ้น*6
- ปัญหาต่อไต*7
- ปัญหาต่อกระดูก*8

*5 การเปลี่ยนแปลงต่อรูปร่างของร่างกาย

ไม่เพียงแต่เดสโควีเท่านั้น การรับประทานยาต้าน HIV อาจทำให้มีไขมันที่หน้าอกและท้อง หรือตั้งแต่คอจนถึงหลังตอนบนหรือสูญเสียไขมันในส่วนแขนขาและใบหน้า

*6 การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่มากขึ้น



หลังรับประทานยาต้าน HIV อาจทำให้รู้สึกถึงความผิดปกติ ทางร่างกายจากการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันทานอย่างกระทันหัน

*7 ปัญหาต่อไต

ยาต้าน HIV บางชนิดจะมีผลต่อไต ซึ่งจากการทดลองทางแพทย์พบว่าเดสโควีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของไตน้อยกว่าทราเวต้า แต่มีโอกาสทำให้ไตวายหรือไตทำงานผิดปกติได้ จึงต้องตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ ทั้งก่อนรับประทานและในระหว่างที่รับประทานเดสโควี และหากการทำงานของไตแย่ลงในระหว่างที่รับประทานเดสโควี อาจต้องหยุดรับประทาน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ฯลฯ

*8 ปัญหาต่อกระดูก

โรคติดเชื้อ HIV หรือผลจากการรับประทานเดสโควีหรือยาอื่นอาจทำให้เกิดปัญหาต่อกระดูก กรณีที่เป็นโรคกระดูกอยู่แล้วอาจต้องตรวจความหนาแน่นกระดูก



ก่อนที่จะเริ่มรับประทานเดสโควี จำเป็นต้องแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ให้แพทย์ทราบ

- ปัญหาเกี่ยวกับตับ หรือเคยเป็นโรคตับในอดีต (รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบี)
- ปัญหาเกี่ยวกับไต
- ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
- โรคอื่นๆ ที่เคยเป็นในอดีตและในปัจจุบัน



ผลข้างเคียงที่พบบ่อยเมื่อรับประทาน
เดสโควีคืออาการคลื่นไส้ ท้องเสีย
ปวดหัว ฯลฯ

อาจจำเป็นต้องหยุดรับประทานหากมีผลข้างเคียง แต่กรุณาอย่าหยุดรับประทานหรือเปลี่ยนวิธี
รับประทานด้วยตนเองอย่างเด็ดขาด หากรู้สึกว่าจะเกิดความผิดปกติใด ๆ ต่อร่างกาย กรุณาติดต่อ
โรงพยาบาลทันที

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การรับประทานในช่วงตั้งครรภ์ควรทำอย่างไร?

ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงผลกระทบของเดสโควีที่ต่อสตรีมีครรภ์หรือเด็กในครรภ์

กรุณาปรึกษาแพทย์อย่างรอบคอบว่าจะรับประทานเดสโควีในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ ผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือมีความประสงค์ที่จะตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งแพทย์ก่อนที่จะเริ่มรับประทานเดสโควี

เกี่ยวกับการให้นมบุตร

HIV สามารถติดจากแม่สู่ลูกได้ผ่านการให้น้ำนม กรุณาเลี่ยงการให้นมบุตร


ทั้งนี้ Emtricitabine ในเดสโควีอาจถูกส่งผ่านไปยังน้ำนมได้ แต่ยังไม่ทราบว่า Tenofovir alafenamide fumarate จะถูกส่งผ่านไปยังน้ำนมด้วยหรือไม่ และยังไม่ทราบแน่ชัดถึงผลของเดสโควีที่มีต่อเด็กอ่อน

สำหรับวิธีรับประทานอาหารของเด็กอ่อน ฯลฯ กรุณาปรึกษาแพทย์



หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV

- ศูนย์วิจัยพัฒนาและรักษาโรคเอดส์ โรงพยาบาลศูนย์วิจัยทางการแพทย์ระหว่างประเทศแห่งชาติ <https://www.acc.go.jp/> (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) (สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2021)
- ศูนย์พัฒนาการแพทย์ขั้นสูง HIV/AIDS ศูนย์การแพทย์โอซาก้า โรงพยาบาลของรัฐ <https://osaka.hosp.go.jp/department/khac/center/> (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) (สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2021)
- เครื่องช่วยข้อมูลป้องกันเอดส์ <https://api-net.jfap.or.jp/> (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) (สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2021)



มีข้อควรระวังอื่นไหม?

กรณาระวังในสิ่งที่ระบุต่อไป

- กรุณาเข้ารับการตรวจเป็นระยะในระหว่างที่รับประทาน หากไม่มีคำสั่งแพทย์กรุณาอย่าหยุดรับประทานหรือเปลี่ยนวิธีรับประทานด้วยตนเอง
- ห้ามให้ยาแก่ผู้อื่น

ข้อควรระวังในชีวิตประจำวัน

- จากการวิจัยในต่างประเทศ1-4แสดงให้เห็นว่า การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควบคุมให้ปริมาณ HIV RNA ในเลือดคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 200 copies/ml จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยได้* แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์
- อาจมีกรณีที่อีกฝ่ายเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคหนองในเทียม โรคหนองใน และโรคซิฟิลิส หรือมีเชื้อ HIV ประเภทที่ยาออกฤทธิ์ได้ยากก็ได้ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้ จึงควรให้ความใส่ใจในการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง

* Undetectable= Untransmittable; U = U

- 1: Rodger A, et al.: JAMA 2016; 316(2): 171 2: Rodger AJ, et al.: Lancet 2019; 393: 2428
 3: Bavinton BR, et al.: Lancet HIV 2018; 5(8): e438 4: การรักษาด้วยการใช้ยาด้าน HIV ฉบับเดือนมีนาคม 2021

วิธีเก็บรักษาเดสโควี

- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บในภาชนะที่มีให้แต่แรก
- เก็บในอุณหภูมิห้องโดยเลี่ยงความชื้น โปรดเลี่ยงการเก็บในที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
- ปิดฝาให้สนิทหลังจากนำยาออกจากภาชนะเพื่อรับประทาน
- กรุณาเก็บรักษาโดยไม่นำตัวดูดความชื้น (รูปด้านขวา) ภายในบรรจุภัณฑ์ออก



ตัวดูดความชื้น

วิธีเปิดฝาเดสโควี

เดสโควีมีวิธีเปิดฝาแบบพิเศษ

- (1) กดฝาจกด้านบนค้างไว้
- (2) หมุนไปด้านซ้าย



ที่มา : DESCOVY Full Prescribing Information (Issued : April 2016), Gilead Sciences , Inc.

ติดต่อสอบถาม

บริษัท กิเลียด ไซเอนซ์ จำกัด

แกรนด์โตเกียวเซาท์ทาวเวอร์ 1-9-2 มะรุโนะอุจิ เขตชิโยดะ โตเกียว รหัสไปรษณีย์ 100-6616

<https://www.gilead.co.jp/>

〈タイ語版〉

DVY21DS0134PA จัดทำเดือนพฤศจิกายน 2021