

# ベクルリー 投与チェックシート

氏名： \_\_\_\_\_ カルテ No. : \_\_\_\_\_ 記入日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

症状発現日： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日






ベクルリーの投与期間の目安は、状態によって異なります。

重症化リスク因子を有する等の患者（酸素投与を要しない）：3日目まで

3日目まで継続






肺炎を有する患者：5日目まで

5日目まで継続

成人	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
投与量	200 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
バイアル本数					
日付	/	/	/	/	/
投与した時間	:	:	:	:	:
投与した医師 ／看護師					

肺炎症状の改善が認められない場合：10日目まで継続

10日目まで継続

成人	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
投与量	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
バイアル本数					
日付	/	/	/	/	/
投与した時間	:	:	:	:	:
投与した医師 ／看護師					

## ベクルリーの用法及び用量について

### 6. 用法及び用量

通常、成人及び体重40kg以上の小児にはレムデシビルとして、投与初日に200mgを、投与2日目以降は100mgを1日1回点滴静注する。

通常、体重3.5kg以上40kg未満の小児にはレムデシビルとして、投与初日に5mg/kgを、投与2日目以降は2.5mg/kgを1日1回点滴静注する。なお、総投与期間は10日までとする。

### 7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）

7.2 SARS-CoV-2による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始し、3日目まで投与する。ただし、SARS-CoV-2による肺炎を有する患者では、目安として、5日目まで投与し、症状の改善が認められない場合には10日目まで投与する。

【ベクルリー点滴静注用100mg 添付文書2023年2月改訂（第8版）】

製造販売元

ギリアド・サイエンシズ株式会社

〒100-6616 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

<https://www.gilead.co.jp/>

文献請求先及び問い合わせ先

ギリアド・サイエンシズ株式会社

メディカルサポートセンター

フリーダイヤル: 0120-506-295 9:00-17:30（土日祝日及び会社休日を除く）

VKY23DS0202PHA  
2023年2月作成